

Funções - Segunda Lista de Exercícios

Recomendações

- Nesta lista de exercícios há problemas algébricos e também de “modelagem matemática”. Em ambas as situações o objetivo é recordar e aprofundar o que foi visto no ensino médio a respeito de funções. Alguns tópicos mais diretamente relacionados ao assunto serão também trabalhados.
- Quando julgar necessário, utilize uma calculadora, um computador, ou mesmo uma planilha, para fazer estimativas que dêem a você uma idéia numérica.
- Matemática é algo que também se aprende junto com outras pessoas. Por isso, discuta em grupo, pesquise e debata suas idéias com os colegas.
- *Mais importante que conseguir resolver uma questão é pensar e refletir sobre ela*

Módulo 1 - Generalidades sobre Funções

1. Sejam $A = \{a, e, i, o, u\}$ e $B = \{1, 2, 3, 4, 5\}$. Com a tabela

x	y
a	4
e	3
i	3
o	2
u	1

estabelecemos uma regra entre os elementos de A e B de modo que a cada $x \in A$ colocado na tabela, associa-se o $y \in B$ colocado à sua direita. Verifique se a regra assim estabelecida determina uma função $f : A \rightarrow B$.

2. Com os mesmos conjuntos A e B do exercício anterior, quais das tabelas a seguir dão origem a funções $f : A \rightarrow B$?

a)	x	y	b)	x	y	c)	x	y	d)	x	y	e)	x	y
	a			a	1		a	1		a	1		a	5
	e	1		e	1		e	2		e	2		e	5
	i			i	1		i	3		e	3		i	5
	o	2		o	2		o	4		i	4		o	5
	u			u	2		u	5		u	5		u	5
										u	1			

f)	x	y
	a	1
	i	2
	u	3


g)	x	y
	a	3
	e	4
	i	5
	o	5
	u	4

h)	x	y
	a	1
	e	4
	i	2
	o	5
	u	3

i)	x	y
	a	2
	e	1
	i	2
	o	3
	u	3

3. Entre as funções determinadas pelas tabelas do exercício anterior, determine quais são injetoras, quais são sobrejetoras e quais são bijetoras.

4. Em cada item a seguir, considere o conjunto G dos pontos assinalados na malha



formado por pontos do produto cartesiano $A \times B$, onde $A = \{1, 2, 3, 4\}$ e $B = \{a, b, c, d\}$, exceto em f), onde $B = \{a, b, c\}$. Em cada caso, verifique se G determina uma função.

5. Dentre as funções determinadas pelo conjunto $G \subset A \times B$ do exercício anterior, determinar quais são injetoras, quais são sobrejetoras e quais são bijetoras.

6. Nos exercícios 2 e 4, nos casos em que se tem funções $f : A \rightarrow B$, determine $\text{Im}(f)$.

7. Sabe-se que um triângulo está inscrito na semi-circunferência de diâmetro a é retângulo. Se os catetos são x e y , expresse y como função de x . Expresse a área desse triângulo como função de x .

8. Um retângulo inscrito na semi-circunferência de diâmetro a tem lados x e y , sendo que y está sobre o diâmetro a . Expresse y em função de x . Expresse a área do retângulo em função de x .
9. Expresse o lado do quadrado inscrito em um triângulo ABC, em função da base a e da altura h .
10. A tela dos monitores dos computadores mais antigos são compostas de pequenos quadradinhos que se iluminam chamados "pixels". Considere que uma tela retangular tenha 1200 pixels na horizontal e 800 pixels na vertical. Um "bug" inicia sua trajetória na tela a partir da margem esquerda a 80 pixels da base e, ao fim de cada segundo, ela caminha 6 pixels na horizontal para a direita, e 4 na vertical para cima.

(a) Com base nessas informações complete a tabela:

Instante	0	1	2	3	4	5	...	s	...
Horizontal	0	6	12			
Vertical	80	84				

- (b) Determinar a posição do "bug" nos instantes 20s, 25s, 50s.
- (c) Determinar em que instante o "bug" sai da tela.
- (d) Determinar a posição em que o "bug" sai da tela.
- (e) Expresse a posição do "bug" em função do tempo s .
11. Considere que no caso do exercício anterior, no mesmo instante em que o "bug" entra pelo lado esquerdo da tela "mug", um outro "bicho informático", inicia seu passeio pela tela pelo lado direito a 100 pixels da base e que ao fim de cada segundo ele se desloque 6 pixels na horizontal para a esquerda e 2 pixels na vertical para cima.
- (a) Faça uma tabela indicando a posição do "mug" a cada segundo;
- (b) Determine a posição do "mug" nos instantes 20 s, 35 s e 50 s.
- (c) Determine o instante em que o "mug" deixa a tela.
- (d) Determine o ponto em que isso ocorre.
- (e) Determine o ponto de cruzamento das trajetórias do "bug" e do "mug".
- (f) Haverá encontro do "bug" com o "mug"?
- (g) Encontre uma expressão para a posição do "mug" em função do tempo s .

12. Tico e Teco, torcedores fanáticos de certo time da capital, ganharam de seus tios uns cofrinhos na forma de porquinhos. No de Tico havia R\$30,00 e no de Teco R\$ 50,00. Os moleques resolveram guardar parte da mesada semanal. Tico prometeu guardar R\$ 5,00 por semana e Teco, R\$ 3,00.

- (a) Faça uma tabela representando a situação semanal das mesadas de Tico e Teco.
- (b) Determinar as quantias nos cofrinhos em 20 semanas.
- (c) Quando terão quantias iguais?
- (d) Em que semana Tico terá R\$ 12,00 a mais que Teco?
- (e) Em que semana Teco terá R\$ 12,00 a mais que Tico?
- (f) Em que momento Tico terá o dobro da quantia de Teco?
- (g) Expresse a quantia guardada pelo Tico em função do número n de semanas.
- (h) Expresse a quantia guardada pelo Teco em função do número n de semanas.

13. Calcular $f(a)$ sabendo que:

a) $a = -1$ e $f(x) = x^2 - 3x + 2$

b) $a = 0$ e $f(x) = \frac{x^3 - 1}{1 - x^2}$

c) $a = \frac{7}{2}$ e $f(x) = \frac{2}{x}$

d) $a = 1$ e $f(x) = \frac{x^3 - 3x^2 + 2x - 1}{x^2 - 5x + 1}$

14. Se $f(x) = x^3 + 4x - 3$, calcule $f(1)$, $f(-1)$, $f(0)$, $f(\frac{1}{2})$ e $f(\sqrt{2})$.

15. Seja $g(x) = \frac{1}{x^2 + 4}$, calcule:

(a) $g\left(\frac{1}{a}\right)$ (b) $\frac{1}{g(a)}$ (c) $g(a^2)$ (d) $[g(a)]^2$ (e) $g(\sqrt{a})$ (f) $\sqrt{g(a)}$

16. Calcular $\frac{f(x) - f(a)}{x - a}$, fazendo as simplificações possíveis, supondo que $x \neq a$, em cada um dos itens a seguir:

a) $f(x) = x^2 - 4$

b) $f(x) = x^3$

c) $f(x) = \frac{1}{x}$

c) $f(x) = 4x^4$

17. Se $f(x) = \frac{x+1}{x-1}$ calcular:

$$(a) f(-x) \quad (b) f\left(\frac{1}{x}\right) \quad (c) f\left(\frac{1}{1-x}\right) \quad (d) f(f(x))$$

18. Determine o domínio das seguintes funções

a) $f(x) = \sqrt{x+5}$

b) $f(x) = \sqrt{4-x^2}$

c) $f(x) = \sqrt{\frac{-x+2}{x+1}}$

d) $f(x) = 4\sqrt{\frac{-8x+12}{x+5}}$

e) $f(x) = \sqrt{5+4x-x^2}$

f) $f(x) = \sqrt{x-x^3}$

g) $f(x) = \sqrt{-x} + \frac{1}{\sqrt{2-x^2}}$

h) $\sqrt{\frac{x^2+2x-3}{x+1}}$

19. Seja $f : A \rightarrow \mathbb{R}_+$. Determine o domínio A para as seguintes funções:

a) $f(x) = 3x + 1$

b) $f(x) = x^2 - 5x + 6$

c) $f(x) = \frac{2x-5}{1-x}$

d) $f(x) = \frac{1}{x^2-4}$

e) $f(x) = |3-x| - 1$

f) $\sqrt{\frac{x}{10}}$

20. Seja $f : A \rightarrow [0, 1]$. Determine o domínio A , quando f é dada por:

a) $f(x) = 3x - 1$

b) $f(x) = \frac{|x|}{x}$

c) $f(x) = -x^2 + x + 2$

d) $f(x) = \frac{1-x}{3-x}$

21. As funções $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $f(x) = \sqrt{x^2}$ e $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $g(x) = x$ são iguais? Explique.

22. As funções f e g , cujas regras são dadas respectivamente por

$$f(x) = \sqrt{\frac{x-1}{x+1}} \quad \text{e} \quad g(x) = \frac{\sqrt{x-1}}{\sqrt{x+1}}$$

podem ser iguais? Explique.

23. As funções f e g , definidas de $A = \{x \in \mathbb{R} \mid -1 \leq x \leq 0 \text{ ou } x > 1\}$ em \mathbb{R} , são dadas pelas regras:

$$f(x) = \sqrt{\frac{x-1}{x+1}} \quad \text{e} \quad g(x) = \frac{\sqrt{x-1}}{\sqrt{x+1}}$$

Elas são iguais? Explique.

24. As funções

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \quad \text{e} \quad f: \mathbb{R} - \{1\} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \mapsto x+1 \quad \text{e} \quad x \mapsto \frac{x^2-1}{x-1}$$

são iguais? Explique.

25. Construir o gráfico e determinar o conjunto imagem das seguintes funções:

$$\text{a) } f(x) = \begin{cases} x^2 & \text{se } -1 \leq x \leq 1 \\ -2 & \text{se } x < -1 \text{ ou } x > 1 \end{cases}$$

$$\text{b) } f(x) = \begin{cases} \frac{x^2-4}{x+2} & \text{se } x \neq -2 \\ 3 & \text{se } x = -2 \end{cases}$$

$$\text{c) } f(x) = \begin{cases} x^3 & \text{se } 0 \leq x < 2 \\ -x^2+9 & \text{se } 2 \leq x \leq 3 \\ -1 & \text{se } x < 0 \text{ ou } x > 3 \end{cases}$$

$$\text{d) } f(x) = \begin{cases} -x^2+4 & \text{se } -2 \leq x \leq 0 \\ x^2-2x+1 & \text{se } 0 < x \leq 2 \\ -1 & \text{se } x < -2 \end{cases}$$

$$\text{e) } f(x) = \begin{cases} -|x+2| & \text{se } 0 \leq x \leq 2 \\ -x^2-4x & \text{se } -2 \leq x < 0 \\ -4 & \text{se } x < -2 \text{ ou } x > 2 \end{cases}$$

26. Em cada item a seguir escrevemos abreviadamente $\mathbb{R}^2 = \mathbb{R} \times \mathbb{R}$. Verificar se o conjunto dado pode ser o gráfico de uma função $y = f(x)$. Em caso afirmativo, explicitá-la:

$$\text{a) } G = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 - 3y = 1\}$$

$$\text{b) } G = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} = 1\}$$

$$\text{c) } G = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y^2 - x^2 = 1\}$$

$$\text{d) } G = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x = y^3\}$$

$$\text{e) } G = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 - 2x + y^2 - 4y = -4\}$$

$$\text{f) } G = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid |x| = |y|\}$$

27. Usando, por exemplo, o WINPLOT¹ obtenha o gráfico das funções a seguir:

(a) $f(x) = ax + b$ para diferentes valores das constantes a e b

(b) $f(x) = x^2$

(c) $f(x) = \sqrt{x}$

(d) $y = \frac{1}{x}$

(e) $f(x) = |x|$

28. Esboçar o gráfico das seguintes funções (pode usar o WINPLOT)

(a) $f(x) = 4 - x^2$ (b) $g(t) = -1$ (c) $f(s) = -\frac{1}{s}$

(d) $f(x) = x(1 - x)$ (e) $h(x) = \sqrt{x - 1}$ (f) $h(z) = |1 - z|$

(g) $g(x) = |1 - x^2|$ (h) $f(t) = |t^2 - 2t - 3|$ (i) $f(t) = t^2 - 2|t| - 3$

(j) $f(t) = |t^2 - 2|t| - 3|$ (k) $f(x) = |2x - 1|$ (l) $f(x) = |1 - |1 - x||$

29. Dada a função $f(x) = x^2 + 1$, mostre que $f\left(\frac{1}{a}\right) = \frac{f(a)}{a^2}$

30. Se $f(x) = ax + b$ mostre que vale $f\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right) = \frac{f(x_1) + f(x_2)}{2}$.

31. Se $f(x) = x^2$ mostre que $f\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right) \leq \frac{f(x_1) + f(x_2)}{2}$.

32. Uma função f com domínio $A \subset \mathbb{R}$ é *par* se $f(-a) = f(a)$ para todo a em A tal que $-a \in A$, e *ímpar* se $f(-a) = -f(a)$. Determine em cada alternativa abaixo se f é par, ímpar, ou nem par nem ímpar.

(a) $f(x) = 3x^3 - 4x$ (b) $f(x) = 7x^4 - x^2 + 7$ (c) $f(x) = 9 - 5x^2$

(d) $f(x) = 2x^5 - 4x^3$ (e) $f(x) = -2$ (f) $f(x) = 2x^3 + x^2$

(g) $f(x) = 2x^2 - 3x + 4$ (h) $f(x) = \sqrt{x^2 + 1}$ (i) $f(x) = \sqrt[3]{x^3 - 4}$

(j) $f(x) = |x| + 5$ (k) $f(x) = \frac{1}{x^2 + 1}$ (l) $f(x) = \frac{x}{x^2 + 1}$

¹Esse *software* para construção de gráficos está disponível gratuitamente em <http://math.exeter.edu/rparris>. Para construções geométricas veja também o *software* livre KSEG em <http://www.mit.edu/~ibaran>.

33. Dada uma função qualquer f , definida em toda a reta (ou num intervalo $] -a, a[$), mostre que a função $g(x) = f(x) + f(-x)$ é par.
34. Uma função f é dita *aditiva* se o domínio de f é \mathbb{R} e $f(a + b) = f(a) + f(b)$ é verdadeiro para todos os números reais a e b .
- Dê um exemplo de função aditiva.
 - Dê um exemplo de função não-aditiva.
 - Mostre que se f é uma função aditiva, então $f(0) = 0$.
 - Mostre que uma função aditiva deve satisfazer a $f(-x) = -f(x)$.
35. Dada $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ considere as funções $p, q : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definidas como $p(x) = \frac{f(x) + f(-x)}{2}$ e $q(x) = \frac{f(x) - f(-x)}{2}$, para todo $x \in \mathbb{R}$. Mostre que p é par e que q é ímpar.
36. Seja f a função definida pela equação $y = x + \frac{1}{x}$.
- Qual o domínio de f ?
 - Qual a imagem de f ?
 - Esboçe o gráfico de f .
 - Quais dos seguintes pontos pertencem ao gráfico de f : $(-1, -2)$, $(2, 1)$, $(1, 2)$, $(-2, -5/2)$, $(3, 7/2)$?

Módulo 2 - Funções Injetoras, Sobrejetoras e Inversas

37. Nas funções seguintes classifique em: injetora; sobrejetora; bijetora; não é nem injetora nem sobrejetora.
- $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $f(x) = 2x - 1$
 - $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}_+$ tal que $g(x) = 1 - x^2$
 - $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}_+$ tal que $h(x) = |x - 1|$
 - $m : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ tal que $m(x) = 3x + 2$
 - $p : \mathbb{R}^* \rightarrow \mathbb{R}^*$ tal que $p(x) = \frac{1}{x}$ (onde $\mathbb{R}^* = \mathbb{R} - \{0\}$)
 - $q : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $q(x) = x^3$
 - $r : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $r(x) = |x|(x - 1)$

38. Para cada uma das funções a seguir, obtenha a expressão para a sua inversa.

(a) $f(x) = 2x + 3$; (b) $f(x) = ax + b$; $a \neq 0$ (c) $f(x) = \frac{1}{x}$
 (d) $f(x) = \frac{1}{1-x}$; (e) $f(x) = \sqrt{x-4}$ (f) $f(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x}}$
 (g) $f(x) = \frac{x}{x-1}$ (h) $f(x) = 1 - \sqrt{1-x^2}$ (i) $f(x) = \frac{x}{1-x^2}$

39. Seja $f(x)$ a temperatura (em °C) quando a coluna de mercúrio de um dado termômetro mede x centímetros. Em termos práticos, qual é o significado de $f^{-1}(C)$?

40. Nos itens a seguir, decida se a função f é inversível ou não:

- (a) $f(d)$ é o total de litros de combustível consumido por um avião ao final de d minutos de um determinado voo.
- (b) $f(t)$ é o número de clientes presentes nas Lojas Americanas, t minutos após o meio-dia de 29 de março de 2006.
- (c) $f(x)$ é o volume, em litros, de x quilogramas de água a 4 °C.
- (d) $f(w)$ é o custo, em reais, de se remeter uma carta que pesa w gramas.
- (e) $f(n)$ é o número de alunos de uma turma de Cálculo, cujos aniversários caem no n -ésimo dia do ano.

41. Faça uma tabela para os valores de f^{-1} , onde a f é dada abaixo. O domínio de f são os naturais de 1 a 7. Especifique o domínio de f^{-1} .

x	1	2	3	4	5	6	7
$f(x)$	3	-7	19	4	178	2	1

42. A função $f(x) = x^3 + x + 1$ é inversível. Utilizando uma calculadora gráfica, ou um computador, determine o valor aproximado de $f^{-1}(20)$.

43. Utilizando um computador, ou uma calculadora gráfica, trace o gráfico das seguintes funções, e decida se elas são ou não inversíveis.

a) $f(x) = x^2 + 3x + 2$ b) $f(x) = x^3 - 5x + 10$ c) $f(x) = x^3 + 5x + 10$

44. Seja $f :]-\infty, -1] \rightarrow [1, +\infty[$ definida por $f(x) = \sqrt{x^2 - 2x + 3}$ qual o valor do domínio de f^{-1} com imagem 3?

45. Determine a função inversa de cada uma das funções abaixo.
- (a) $f(x) = 8 + 11x$ (b) $f(x) = 2x^3 - 5$ (c) $f(x) = 7 - 3x^3$
 (d) $f(x) = x$ (e) $f(x) = (x^3 + 8)^5$ (f) $f(x) = x^{1/3} + 2$
46. Seja f a função definida por $f(x) = \sqrt{4 - x^2}$ para $x \geq 0$. Mostre que f é a sua própria inversa.
47. Seja $f : A \rightarrow [-9, -1[$ dada por $f(x) = \frac{3 + 4x}{3 - x}$. Pede-se:
- (a) Determinar A .
 (b) Mostrar que f é injetora.
 (c) Verificar se f é sobrejetora.
48. Seja $f : A \rightarrow]1, 10]$ dada por $f(x) = \frac{4 - 11x}{4 - 2x}$. Pede-se:
- (a) Determinar A .
 (b) Mostrar que f é injetora.
 (c) Verificar se f é sobrejetora.
49. Seja $f : A \rightarrow]-4, 1]$ dada por $f(x) = \frac{10 + 3x}{10 - 2x}$. Pede-se:
- (a) Determinar A .
 (b) Mostrar que f é injetora.
 (c) Verificar se f é sobrejetora.
50. Suponha que f é inversível e crescente. O que se pode dizer a respeito de sua inversa ser crescente ou decrescente?
51. Se uma função f é inversível e côncava para cima, o que se pode dizer a respeito da concavidade de sua inversa?
52. Dada a função $f(x) = -x^2 + 2x + 3$, onde $x \geq 1$, obter uma expressão para sua inversa, o domínio dessa inversa e representar f e f^{-1} graficamente.

53. Dada a função $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x^3 - 1}}$, $x \neq 1$, determinar:

- (a) Sua função inversa f^{-1}
- (b) O conjunto $\text{Im}(f)$.

54. Dada a função $f(x) = \frac{9 - x^2}{4 - x^2}$, $x \geq 0$, pede-se:

- (a) Mostrar que f é injetora.
- (b) Determinar a função inversa f^{-1} .
- (c) Determinar o conjunto $\text{Im}(f)$.

55. Determinar, se existir, a função inversa de cada uma das funções a seguir:

- (a) $f(x) = \sqrt{3x - 1}$, onde $x \in]\frac{1}{3}, +\infty[$.
- (b) $f(x) = \sqrt{x^2 - 4}$, onde $x \in]-\infty, -2[$.
- (c) $f(x) = \sqrt{2 - x - x^2}$, onde $x \in [-2, 1]$.

56. Dada a função

$$f(x) = \begin{cases} -x^2 & \text{se } x \geq 0 \\ |x| & \text{se } x < 0 \end{cases}$$

verificar se ela é inversível e, em caso afirmativo, determinar sua inversa.

57. A função f definida em \mathbb{R} por $f(x) = |x + 2| + |x - 1|$ admite inversa?

Módulo 3 - A Família das Funções Lineares

58. Se $f(x) = 4x - 3$ mostre que $f(2x) = 2f(x) + 3$.

59. Se $f(x) = ax$ mostre que $f(x) + f(1 - x) = f(1)$ para todo x real. Mostre também que $f\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right) = \frac{f(x_1) + f(x_2)}{2}$ quaisquer que sejam os números reais x_1 e x_2 .

60. Encontre a inclinação e a intersecção vertical da reta cuja equação é $2y + 5x - 8 = 0$.

61. Em cada item a seguir encontre a equação da reta que passa pelo par de pontos

- (a) (3,2) e (-2,4) (b) (1,1) e (2,-2)
(c) (-3,-3) e (4,9) (d) (-1,-3) e (-2,5)
(e) (0,0) e (3,2) (f) (5,0) e (0,5)
(g) (-2,-3) e (5,-7) (h) $\left(\frac{1}{5}, 2\right)$ e $\left(\frac{5}{2}, -2\right)$
(i) $\left(\frac{1}{3}, \frac{1}{4}\right)$ e $\left(\frac{2}{3}, \frac{1}{3}\right)$

62. Nos itens de (a) a (d) encontre os valores de x para os quais a inclinação da reta ligando os dois pontos dados:

- (i) é zero (ii) não existe (iii) é positivo (iv) é negativo
(a) (2,3) e (x,5) (b) (6,-1) e (3,x)
(c) (4,x) e (x,2) (d) $(-6, x^2)$ e $(x^2, -2)$

63. Determine se a reta passando pelos dois primeiros pontos é paralela à reta passando pelos dois últimos

- (a) (6,2) e (0,2); (5,1) e (12,10) (b) (-2,-4) e (-4,1); (7,4) e (-3,19)
(c) (6,-1) e (11,1); (5,-2) e (20,4) (d) (-1,4) e (7,1); (4,2) e (15,-2)

64. Nos itens a seguir encontre a equação da reta que possui inclinação m , e que passa pelo ponto dado.

- (a) $m = \frac{1}{2}$, $\left(\frac{1}{3}, 3\right)$ (b) (-2,5), $m = -\frac{2}{3}$
(c) $m = 1$, (-4, -3) (d) $m = -1$, (-3, -3)
(e) (0,3), $m = -2$ (f) (3,0), $m = 2$
(g) (-4,3), $m = 0$ (h) (1,-3), $m = 0$

65. Nos itens a seguir determine a inclinação e as intersecções com os eixos x e y das funções definidas pelos gráficos:

- (a) $\{(x, y) \mid 3x + 4y - 6 = 0\}$ (b) $\{(x, y) \mid x - 2y + 4 = 0\}$
(c) $\{(x, y) \mid -4x + 5y + 12 = 0\}$ (d) $\{(x, y) \mid 2y + y = 0\}$

66. O gráfico de uma função linear, f , tem coeficiente angular $m = 2$. Se $(-1, 3)$ e $(c, -2)$ pertencem ambos ao gráfico de f , encontre o número c .

67. Nos problemas a seguir, determine o ponto de intersecção das duas retas, se existir, e desenhe os gráficos em cada situação.

- (a) $3x + y - 1 = 0$ e $2x + y - 1 = 0$
- (b) $-2x + 3y - 6 = 0$ e $-2x + 3y + 3 = 0$
- (c) $-2x + 5y + 30 = 0$ e $5x + 2y - 2 = 0$
- (d) $-x + y - 2 = 0$ e $x + y - 2 = 0$
- (e) $y - 3x = 0$ e $y - 3x + 1 = 0$
- (f) $y + x + 1 = 0$ e $2y + 2x + 1 = 0$

68. (a) Qual a equação da reta que passa pelos pontos $(0, 3)$ e $(5, 0)$.
 (b) Mostre que a equação da reta que passa pelos pontos $(0, b)$ e $(a, 0)$ pode ser escrita na forma (chamada forma *segmentária*):

$$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1 \quad (a \cdot b \neq 0)$$

69. Encontre a equação da reta que passa pelo ponto $(2, 1)$ e que é perpendicular à reta $y = 5x + 3$.

70. Encontre a equação das retas paralela e perpendicular à reta $y + 4x = 7$ e que passa pelo ponto $(1, 5)$.

71. Seja $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $f(x) = \frac{3x - 1}{4}$. Para que valores do domínio a imagem é menor que 4?

72. Para que valores de $x \in \mathbb{R}$ a função $f(x) = \frac{2}{3} - \frac{x}{2}$ é negativa?

73. Valores correspondentes a p e q são dados na tabela a seguir:

p	1	2	3	4
q	950	900	850	800

- (a) Determine q como uma função linear de p .
- (b) Determine q como função linear de p .

74. Uma função linear foi utilizada para gerar os valores da tabela a seguir. Encontre esta função.

x	5,2	5,3	5,4	5,5	5,6
y	27,8	29,2	30,6	32,0	33,4

75. Três operários trabalhando 8 horas por dia, constróem um muro de 30 m em cinco dias. Quantos dias serão necessários para que cinco operários, trabalhando 6 horas por dia, construam um muro de 75 m?
76. Encontre o comprimento do segmento da reta $3x + 4y = -12$ que está entre as intersecções horizontal e vertical.
77. O custo de uma plantação é, normalmente, uma função do número de hectares semeado. O custo do equipamento é um *custo fixo*, pois tem que ser pago independentemente do número de hectares plantado. O custo de suprimentos e mão-de-obra varia com o número de hectares plantados e são chamados de *custos variáveis*. Suponha que os custos fixos sejam de R\$ 10.000,00 e os custos variáveis de R\$ 200,00 por hectare. Seja C o custo total, calculado em milhares de reais, e x o número de hectares plantados.
- Encontre uma fórmula para C em função de x .
 - Esboce o gráfico de C versus x .
 - Explique como você pode visualizar os custos fixos e variáveis no gráfico.
78. Pimentas picantes foram graduadas de acordo com as unidades de Scoville, em que o nível máximo de tolerância humana é de 14.000 Scovilles por prato. O Restaurante Costa Oeste, conhecido por seus pratos picantes, promete um prato especial do dia, que irá satisfazer ao mais ávido aficcionado por pratos apimentados. O restaurante importa pimentas indianas, graduadas em 1.200 Scovilles cada, e pimentas mexicanas, com uma graduação de 900 Scovilles cada.
- Determine a equação de restrição de Scoville, relacionando o número máximo de pimentas indianas e mexicanas que o restaurante deve utilizar na composição do prato especial.
 - Resolva a equação da parte (a) obtenha, explicitamente, o número de pimentas indianas usadas nos pratos mais picantes em função do número de pimentas mexicanas.
79. Um corpo de massa m está caindo com velocidade v . A segunda Lei de Newton do Movimento $F = ma$, estabelece que a força resultante, F , com sentido para baixo, é proporcional à sua aceleração, a . A força resultante, F , é composta pela

Força de gravidade F_g , que age para baixo, menos a força de resistência do ar F_r , que age para cima. A força devida à gravidade é mg , onde g é uma constante. Suponha que a resistência do ar seja proporcional à velocidade do corpo.

- (a) Obtenha uma expressão para a força resultante F , em função da velocidade v .
- (b) Obtenha uma fórmula, dando a em função de v .
- (c) Esboce o gráfico de a versus v .

80. Numa fotocopiadora consta a seguinte tabela de preços:

Nº de cópias	preço por cópia
de 1 a 99	0,15
de 100 a 999	0,12
1000 ou mais	0,10

- (a) Qual o custo de 99 cópias?
- (b) Qual o custo de 101 cópias?
- (c) Qual o custo de 999 cópias?
- (d) Qual o custo de 1001 cópias?
- (e) Esboce um gráfico representando o custo C em função do número n de cópias
- (f) Que observações você faz sobre uma regra de preços como a proposta pela tabela acima? Como você corrige a tabela para evitar distorções?

Módulo 4 - Funções Quadráticas

81. Fatore as seguintes expressões quadráticas

- (a) $x^2 - 3x + 2x^2 + x$
- (b) $\pi x^2 + 3\pi$ e $17x^2 + 51x$
- (c) $\sqrt{2}x^2 + 2x$ e $\sqrt{\pi}x^2 - \pi$
- (d) $x^2 - 9$ e $x^2 - 49$
- (e) $x^2 - 3$ e $x^2 - 1$
- (f) $x^2 - 2$ e $x^2 - \pi$
- (g) $x^2 + x + \frac{1}{4}$ e $x^2 + x + 6$
- (h) $x^2 + x + \frac{1}{4}$ e $x^2 - x - 6$
- (i) $x^2 - 2x + 3$ e $x^2 - 3x - 40$
- (j) $3x^2 - 5x - 2$ e $8x + 2x - 1$
- (k) $2x^2 - 5bx - 3b^2$ e $x^2 - 4x - 21$
- (l) $x^4 - 2x^2 + 1$ e $x^6 - 4x^3 - 21$

82. Utilizando uma calculadora gráfica, ou um computador, estude o comportamento do gráfico de $p(x) = ax^2 + bx + c$ nas seguintes situações:

- (a) Dê valores fixos para b e c (por exemplo, $b = 1$ e $c = 2$) e varie a . Fazendo isso, o que acontece com o gráfico de $p(x)$?
- (b) Dê valores fixos para a e b (por exemplo, $b = 3$ e $b = 5$) e varie c . Descreva o que acontece com o gráfico de $p(x)$.
- (c) Dê valores fixos para a e c (por exemplo, $a = 2$ e $c = 3$) e varie b . Descreva o que acontece com o gráfico de $p(x)$.

83. Observe como fazemos para completar os quadrados das funções $p(x) = x^2 + 2x + 10$ e $q(x) = x^2 - x$.

$$p(x) = x^2 + 2x + 10$$

$$p(x) = x^2 + 2x + 1 - 1 + 10$$

$$p(x) = (x + 1)^2 + 9$$

$$p(x) = x^2 - x$$

$$p(x) = x^2 - 2\left(\frac{1}{2}\right)x + \left(\frac{1}{2}\right)^2 - \left(\frac{1}{2}\right)^2$$

$$p(x) = x^2 - x + \frac{1}{4} - \frac{1}{4}$$

$$p(x) = \left(x - \frac{1}{2}\right)^2 - \frac{1}{4}$$

Utilize essa idéia para completar os quadrados das funções:

(a) $p(x) = x^2 + 5x + 2$

(b) $p(x) = x^2 + 3x + 1$

(c) $p(t) = -3t^2 - 5t + 1$

(d) $p(t) = t^2 - 2t$

(e) $p(x) = x^2 + 3x$

(f) $p(x) = x^2 + 4x - 3$

(g) $p(x) = 4x^2 + 12x + 10$

(h) $p(x) = -16x^2 + 6x$

(i) $p(x) = x^2 + 4bx + c$

(j) $p(x) = ax^2 + ax + b$

(k) $p(x) = \pi(x^2 - 2x)$

(l) $p(x) = 24(-x^2 - 3x + 1)$

84. Resolva as seguintes equações completando os quadrados:

(a) $3x^2 + 6x - 1 = 0$

(b) $3x(3x - 2) = 6x - 5$

(c) $y^2 - 15y - 4 = 0$

(d) $6u^2 + 7u - 3 = 0$

(e) $x^2 - 2x + 9 = 0$

(f) $4z^2 - 4z - 1 = 0$

(g) $p(2p - 4) = 5$

(h) $(x - 2)^2 + 3x - 5 = 0$

(i) $(3x - 2)^2 + (x + 1)^2 = 0$

(j) $5y^2 - 15y + 9 = 0$

85. Deduza a fórmula para a solução da equação quadrática $ax^2 + bx + c = 0$.

86. Use a fórmula para a solução da equação quadrática para resolver as seguintes equações:

(a) $5x^2 + 6x - 1 = 0$	(b) $2x^2 = 18x + 5$
(c) $x(2x - 3) = 2x - 6$	(d) $6x^2 - 7x + 2 = 0$
(e) $2x^2 = 13(x - 1) + 3$	(f) $2x^2 - 6x - 1 = 0$
(g) $1200y^2 = 10y + 1$	(h) $x^2 + 2bx - c^2 = 0$
(i) $x^2 - 6ax + 3a^2 = 0$	(j) $\pi u^2 + (\pi^2 - 1)u - \pi = 0$
(k) $x(x - \sqrt{2} + 4) = 4(x + 1)$	(l) $3x^2 = 5(x - 1)^2$

87. Determine o valor de b em $B = \{y \in \mathbb{R} \mid y \geq b\}$ de modo que a função $f : \mathbb{R} \rightarrow B$ definida por $f(x) = x^2 - 4x + 6$ seja sobrejetora.

88. Determine o maior valor de a em $A = \{x \in \mathbb{R} \mid x \leq a\}$ de modo que a função $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $f(x) = 2x^2 - 3x + 4$ seja injetora.

89. Dada a função quadrática $p(x) = ax^2 + bx + c$, prove que as coordenadas (x_v, y_v) do vértice da parábola são dadas por

$$x_v = -\frac{b}{2a} \quad \text{e} \quad y_v = -\frac{\Delta}{4a},$$

onde $\Delta = b^2 - 4ac$ é o *discriminante* de $p(x) = 0$.

90. Determinar os vértices e a imagem das parábolas

(a) $y = 4x^2 - 4$	(b) $y = -x^2 + 3x$
(c) $y = 2x^2 - 5x + 2$	(d) $y = -x^2 + \frac{1}{2}x + \frac{3}{2}$
(e) $y = -x^2 + x - \frac{2}{9}$	(f) $y = x^2 - \frac{7}{3}x - 2$

91. Qual deve ser o valor de c para que o vértice da parábola $y = x^2 - 8x + c$ esteja sobre o eixo dos x ?

92. Qual deve ser o valor de k para que $y = 2x^2 - kx + 8$ tenha duas raízes reais e iguais?

93. Dentre todos os números reais x e z tais que $2x + z = 8$ determine aqueles cujo produto é máximo.

94. Dentre todos os números de soma 6, determine aqueles cuja soma dos quadrados é mínima.
95. Determine o retângulo de área máxima localizado no primeiro quadrante, com dois lados nos eixos cartesianos e um vértice sobre a reta $y = -4x + 5$.
96. Um arame de comprimento ℓ deve ser cortado em dois pedaços. Um pedaço será usado para formar um círculo, e outro, um quadrado. Onde se deve cortar o arame, para que as áreas das figuras sejam as maiores possíveis?
97. Em uma reação química, um *catalisador* é uma substância que acelera a reação mas que, ela mesma, não sofre transformação. Se o produto de uma reação é um catalisador, a reação é chamada de *autocatalítica*. Suponha que a taxa, r , de uma dada reação autocatalítica é proporcional à quantidade da substância original que ainda permanece vezes a quantidade de produto, p , produzido. Se a quantidade inicial da substância original é A e a quantidade que ainda permanece é $A - p$:
- (a) Exprima r em função de p .
- (b) Qual é o valor de p quando a reação está ocorrendo de forma mais rápida?
98. Para as seguintes funções f , encontre o discriminante de $f(x) = 0$ e determine se as raízes são reais e diferentes, reais e iguais, ou não existem. Esboce o gráfico de $f(x)$ sem desenhar mais de quatro pontos.
- (a) $f(x) = 4x^2 - 4x + 1$ (b) $f(x) = z^2 + z + 1$
- (c) $f(x) = 4x^2 - x - 5$ (d) $f(x) = 7x^2 - 5x - 2$
- (e) $f(x) = x^2 - \sqrt{2}x + \frac{1}{4}$ (f) $f(x) = x^2 - ax - 1$
- (g) $f(x) = 3x^2 + \pi x + 4$ (h) $f(x) = x^2 - 2ax + a^2$
- (i) $f(x) = \sqrt{3}x^2 - 2x - \sqrt{3}$ (j) $f(x) = 9x^2 - 12x + 4$
99. Determine os valores de K para os quais as equações tem raízes reais e iguais.
- (a) $5x^2 - 4x - (5 + K) = 0$ (b) $(K + 2)x^2 + 3x + (K + 3) = 0$
- (c) $x^2 + 3 - K(2x - 2) = 0$ (d) $(K + 2)x^2 + 5Kx - 2 = 0$
- (e) $x^2 - x(2 + 3K) + 7 = 0$ (f) $(K - 1)x^2 + 2x + (K + 1) = 0$
100. Determinar os valores de m para que a função quadrática $f(x) = (m - 1)x^2 + (2m + 3)x + m$ tenha dois zeros reais e distintos.

101. Determinar os valores de m para que a equação do segundo grau $(m+2)x^2 + (3-2m)x + (m-1) = 0$ tenha raízes reais.
102. Determinar os valores de m para que a função $f(x) = mx^2 + (m+1)x + (m+1)$ tenha um zero real duplo.
103. Determinar os valores de m para que a equação $mx^2 + (2m-1)x + (m-2) = 0$ não tenha raízes reais.
104. Prove as *relações de Girard* para equações do segundo grau: se $ax^2 + bx + c = 0$ possui raízes x_1 e x_2 , então $x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}$ e $x_1 \cdot x_2 = \frac{c}{a}$.
105. Mostre que uma equação do segundo grau que tem x_1 e x_2 como raízes é a equação $x^2 - Sx + P = 0$, onde $S = x_1 + x_2$ e $P = x_1 \cdot x_2$.
106. Obtenha uma equação do segundo grau que possua as raízes:
- | | |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| (a) 2 e 3 | (b) $\frac{1}{2}$ e $-\frac{3}{2}$ |
| (c) 0,4 e 5 | (d) 1 e $-\sqrt{2}$ |
| (e) $1 + \sqrt{3}$ e $1 - \sqrt{3}$ | |
107. Determine m na função $f(x) = 3x^2 - 4x + m$ de modo que se tenha $\text{Im}(f) = [2, +\infty[$.
108. Cada uma das expressões a seguir pode ser escrita na forma $\sqrt{a}\sqrt{c^2 \pm (dx+b)^2}$, sendo que c é uma fração. Observe como fazemos isso para $\sqrt{-4x^2+x}$. Cha-

mando $q(x) = -4x^2 + x$ temos:

$$q(x) = -4\left(x^2 - \frac{x}{4}\right)$$

$$q(x) = -4\left(x^2 - 2\left(\frac{1}{8}\right)x + \left(\frac{1}{8}\right)^2 - \left(\frac{1}{8}\right)^2\right)$$

$$q(x) = -4\left(\left(x - \frac{1}{8}\right)^2 - \frac{1}{64}\right)$$

$$q(x) = 4\left(\frac{1}{64} - \left(x - \frac{1}{8}\right)^2\right) \text{ já que } -4 = (-1) \cdot 4$$

$$\sqrt{q(x)} = 2\sqrt{\frac{1}{64} - \left(x - \frac{1}{8}\right)^2}$$

$$\sqrt{q(x)} = 2\sqrt{\frac{1 - 64\left(x - \frac{1}{8}\right)^2}{64}}$$

$$\sqrt{q(x)} = \frac{1}{4}\sqrt{1 - 64\left(x - \frac{1}{8}\right)^2}$$

$$\sqrt{q(x)} = \frac{1}{4}\sqrt{1 - \left(8\left(x - \frac{1}{8}\right)\right)^2}$$

$$\sqrt{q(x)} = \frac{1}{4}\sqrt{1 - (8x - 1)^2}$$

Utilize essa idéia nos itens a seguir:

(a) $\sqrt{x^2 + 3x + 1}$ (b) $\sqrt{-3t^2 + 5t + 1}$

(c) $\sqrt{x^2 + 3x}$ (d) $\sqrt{-16x^2 + 6x}$.

(e) $\sqrt{-x^2 + x + 1}$ (f) $\sqrt{-x^2 + 2x - 4}$

(g) $\sqrt{6x - 4x^2}$ (h) $\sqrt{4x - x^2}$

(i) $\sqrt{6 + x - 2x^2}$ (j) $\sqrt{-x^2 - 2x + 8}$

(k) $\sqrt{9x - 4x^2}$

109. Dada a função quadrática $p(x) = ax^2 + bx + c = 0$, prove que:

- (a) Se $b > 0$ o gráfico de $p(x)$ corta o eixo dos y com a parte crescente.
- (b) Se $b < 0$ o gráfico de $p(x)$ corta o eixo dos y com a parte decrescente.

110. Considere o Polinômio $f(n) = n^2 + n + 41$. Observe que $f(1) = 43$ é primo, $f(2) = 47$ é primo, $f(3) = 53$ é primo. Será que para todos os números $n \in \mathbb{N}$, $f(n)$ será um número primo? Prove ou “desprove” esta afirmação.

111. Prove que somando-se 1 ao produto de quatro números naturais consecutivos o resultado será sempre um quadrado perfeito.

112. Suponha que a , b e c sejam constantes com $a > 0$. Seja f a função definida por $f(x) = ax^2 + bx + c$ com $x \geq \frac{-b}{2a}$. Mostre que a função inversa é dada por $f^{-1}(x) = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac + 4ax}}{2a}$ para $x \geq \frac{4ac - b^2}{4a}$.
113. À medida que a altura referente ao nível do mar aumenta, o peso de um astronauta diminui até atingir a imponderabilidade. Se o peso w do astronauta a altura x km acima do nível do mar é dado pela expressão $w = p \left(\frac{6400}{x + 6400} \right)^2$, onde p é o peso do astronauta ao nível do mar, a que altitude seu peso é inferior a $0,1p$?
114. Se a distância de frenagem d (em metros) de um carro a velocidade de c km/h é dada, aproximadamente, por $d = v + \frac{v^2}{20}$, para quais velocidades o espaço de frenagem é inferior a 20 m?
115. Para que um medicamento faça o efeito desejado a sua concentração na corrente sanguínea deve ser acima do nível terapêutico mínimo. Se a concentração c desse medicamento t horas após ser ingerido é dada por $c = \frac{20t}{t^2 + 4}$ mg/L e o seu nível terapêutico mínimo é 40 mg/L, determine a partir de que instante esse nível é excedido.
116. Considerando que a resistência elétrica R (em Ohms) para um fio de metal puro está relacionado com a temperatura T (em $^{\circ}\text{C}$) pela fórmula $R = R_0(1 + \alpha T)$ onde α , R_0 são constantes positivas. Pede-se:
- Para que temperatura tem-se que $R = R_0$
 - Se a resistência é considerada 0 para $T = -273^{\circ}\text{C}$, determine o valor de α
 - Se a prata tem resistência 1,25 ohms a 0°C a que temperatura sua resistência atinge 2,0 ohms?
117. As dosagens para adultos e para crianças devem ser especificadas nos produtos farmacêuticos. Duas das fórmulas para se especificar as dosagens para crianças a partir das dosagens para adultos são a de Cowling, dada por $y = \frac{1}{24}(t + 1)\alpha$ e a de Friend, dada por $y = \frac{2}{25}t\alpha$ onde α representa a dosagem para adulto, em mg, e t representa a idade da criança, em anos.

- (a) Se $\alpha = 100$ mg, represente graficamente as expressões das dosagens infantis usando as fórmulas de Cowling e de Friend.
- (b) Para que idade as duas fórmulas especificam a mesma dosagem?

118. O IMC (índice de Massa Corporal) é definido como:

$$\phi = \frac{\text{massa}}{(\text{altura})^2}$$

Uma pessoa é considerada obesa quando o índice é maior que 30. Segundo dados publicados na revista *Veja* de 12/01/2004, dos obesos brasileiros 13% são mulheres, 7% homens e 15% são crianças. Pelo critério anterior você se considera obeso? A partir de que peso você passaria a ser considerado obeso? A partir de que altura uma pessoa de 100 kg deixa de ser considerada obesa? Uma pessoa de 1,75 m passa a ser considerada obesa a partir de quantos quilos?

119. Expresse o volume C do tronco de um cone reto de altura h e raio base r em termos de h e r .
120. Expresse o volume C de um cilindro reto de altura x inscrito no cone reto de altura h e raio da base r .